


HAAL HET BESTE UIT ACELEPRYN®

HET 6 STAPPENPLAN VOOR EEN OPTIMALE TOEPASSING



1

Tijdig toepassen. Acelepryn is alleen effectief op het 1ste en 2de stadium van de levenscyclus. Grotere engerlingen en emelten worden niet voldoende bestreden.



2

Engerlingen: toepassen zodra de piekvlucht is geweest. Gebruik hiervoor geschikte feromoonvallen en de juiste lokstof voor een nauwkeurige waarneming.

Emelten: de activiteit van volwassen langpootmuggen bereikt mogelijk pas midden oktober haar hoogtepunt.

Controleer altijd of de piekvlucht heeft plaatsgevonden voor de timing van de toepassing. Locaties met een historische hoge druk hebben een verhoogde kans op herinfectie.



3

Maai voor de toepassing.



4

Spuiten met een dosering van 0,6 liter per ha, in minimaal 600 liter water spuitvloeistof per ha.



5

Zorg ervoor dat het profiel bovenin na de toepassing voldoende vochtig blijft, zodat de larven naar de oppervlakte blijven bewegen en in contact komen met het middel.



6

Stel het maaien zo lang mogelijk uit en breng het maaisel terug als dat mogelijk is.

**GEBRUIK ACELEPRYN ALS ONDERDEEL VAN EEN GEÏNTEGREERD PROGRAMMA.
HOGE EN GEMENGDE POPULATIES VEREISEN EEN LANGDURIGE AANPAK.**

Acelepryn wordt in Nederland exclusief door Vos Capelle gedistribueerd.
Voor meer informatie, neem contact op met Syngenta of met één van de adviseurs van Vos Capelle.

 **Acelepryn®**

syngenta.



Distributeur

Vos Capelle
Hoofdstraat 35
5161 PD, Sprang-Capelle
0416-311326
info@voscapelle.nl
www.voscapelle.nl

Disclaimer:

Syngenta Crop Protection B.V., Postbus 512, 4600 AM Bergen op Zoom. Tel. 0164 225 500, www.syngenta.nl.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. ®/TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company.