

Toelatingen openbaar groen, sport & golf

Juli 2026

Veiligheidsvoorschriften

1. Gebruik alleen bestrijdingsmiddelen met een toelatingsnummer.
2. Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die aanbevolen en/of verplicht worden.
3. Bij inname direct spoelen met water. NOOIT BRAKEN!!!
4. Bij contact aan ogen direct spoelen met een oogdouche.
5. Raadpleeg direct een arts en zorg voor de gegevens van het desbetreffende middel!!!
6. Bij nood 112 of 0900 8844 (alarm)

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, voor de meest actuele toelatingen, etiketten en veiligheidsbladen kijk op:

www.fytostat.nl - Voor actuele toelatingen kijk op: www.ctgb.nl

* De doseringen in **blauw** weergegeven zijn doseringen voor rugspruitgebruik per 1 liter water voor 10 m²

Voor meer informatie: neem contact op met jouw adviseur!

Adviseurs openbaar groen, sportvelden & golfbanen: Peter Mook: 06-19173944 Wout Muilwijk: 06-22028035 Nick Verbeet: 06-82093526 Johan Aalderink: 06-44966661 Kevin Weel: 06-16941413	Adviseurs hoveniers & retail: Casper Hoegen: 06-16349196 Janno Groeneveld: 06-83037584
--	---

OP VERHARDINGEN	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
Roundup Dynamic 16394N <i>(glyfosaat 500g/l)</i>	• Halfopen verhardingen 0,3 liter/ha pleksgewijs 150 ml /10 liter water • Gesloten verhardingen 0,3 liter/ha pleksgewijs 150 ml/ 10 liter water • Open verhardingen 1,4-3,2 liter per ha	Totale onkruidbestrijding op verhardingen. Glyphosaat met bio-activator. Uitsluitend volgens DOB2.0! Niet in grondwaterbeschermings-gebieden.

OP ONBETEELDE TERREINEN	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
Toki 12968N <i>(Flumioxazin 500g/kg)</i> LET OP: na toepassing spuit uitspoelen met water of Easyclean.	1,2 kg per ha - Pleksgewijs: 30 gr/15 liter (klein zakje WOF)	Bodemherbicide met maandenlange werking. Niet tegen opstaande onkruiden: hiervoor Glyfosaat 2 liter per ha bijmengen. Spuit eerst voor 1/3 vullen, dan zakje Toki toevoegen en GOED mengen. Vervolgens pas afvullen, als laatste Glyfosaat toevoegen. Niet tegen heermoes, kruiskruid en kweek. Is ook sterk op mossen! Slechts 1x per jaar toepassen!
Touchdown Quattro 12552N W3 <i>(glyfosaat 360g/l)</i> Vrij van Tallowamine! Expiratiedatum 1-1-2028	0,6-6 liter per ha - Pleksgewijs: 10-20 ml/liter - Pleksgewijs vogelkers: 10 ml/liter - Stobbenbestrijding: 50 ml/liter - Strijkstok: 33%	Op permanent onbeteelde terreinen, open verhardingen, in bosbouw (prunusbestrijding) en openbaar groen. Géén slootbodems. Niet tussen 1 september en 1 maart.
Genoxone ZX 13497N <i>(triclopyr 144 g/l en 2,4-D 140g/l)</i> Goede vervanging van Garlon 4 ^e	Pleksgewijs: 12,5 ml/liter	Op tijdelijke of permanent onbeteelde terreinen, met uitzondering van verhardingen en in de bosbouw. Ter bestrijding brandnetels, distels, heermoes, klaverzuring, bramen en houtachtige planten. Slechts 1x per jaar toepassen! Niet in grondwater-beschermingsgebieden. Niet tussen 1 oktober en 30 april.
Katoun Gold 15330N <i>(Nonaanzuur)</i> Expiratiedatum 01-12-2027	18 liter per ha	Mossen in openbaar groen en particuliere tuinen en ter bestrijding van mossen op permanent onbeteeld terrein (met de uitzondering van gesloten verharding).
Roundup Dynamic 16394N <i>(glyfosaat 500g/l)</i>	- Halfopen verhardingen 0,3 liter/ha pleksgewijs 150 ml/10 liter water - Gesloten verhardingen 0,3 liter/ ha pleksgewijs 150 ml/10 liter water - Open verhardingen 1,4-3,2 liter per ha (max. hoeveelheid per jaar) - Pleksgewijze injectie in stengel: 20 ml in 100 ml water; injectie van 5-10 ml oplossing; 2 toepassingen per 12 maanden.	Onkruidbestrijding op verhardingen 2x per 12 maanden Let op; max. hoeveelheid per jaar! 2x per 12 maanden Let op; max. hoeveelheid per jaar 2x per 12 maanden Uitsluitend volgens DOB2.0! Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

IN BEPLANTING	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
Roundup Dynamic 16394N (glyfosaat 500g/l) Uitsluitend volgens DOB2.0! Niet in grondwater- beschermingsgebieden.	• Halfopen verhardingen 0,3 liter/ha pleksgewijs 150 ml/10 liter water • Gesloten verhardingen 0,3 liter/ ha pleksgewijs 150 ml/10 liter water • Open verhardingen 1,4-3,2 liter per ha (max. hoeveelheid per jaar) • Pleksgewijze injectie in stengel: 20 ml in 100ml water; injectie van 5-10 ml oplossing; 2 toepassingen per 12 maanden.	Onkruidbestrijding op verhardingen 2x per 12 maanden Let op; max. hoeveelheid per jaar! 2x per 12 maanden Let op; max. hoeveelheid per jaar 2x per 12 maanden
Touchdown Quattro 12552N W2 (glyfosaat 360g/l) Vrij van Tallowamine!	• 0,6-6 liter per ha • Pleksgewijs: 20 ml/liter • Pleksgewijs vogelkers: 10 ml/liter • Stobbenbestrijding: 50 ml/liter • Aanstrijken: 33%	Op permanent onbeteelde terreinen, mits niet openbaar toegankelijk. Niet tussen 1 september en 1 maart.
Matos Extra 14681N W1 (glyfosaat 480g/l) Vervalt per 01-01-2028	• 1,5-4,5 liter per ha • Pleksgewijs: 15 ml/liter • Pleksgewijs vogelkers: 7,5 ml/liter • Stobbenbestrijding: 37,5 ml/liter • Strijkstok: 25%	Op permanent onbeteelde terreinen, open verhardingen, in bosbouw (prunusbestrijding) en openbaar groen. Géén slootbodems.
Kerb Flo 13152N (propyzamide 400g/l) Expiratiedatum 1-10-2026	• 2,5-3,75 liter per ha • Pleksgewijs: 10 ml / liter	Beste werking bij toepassing 5-12 °C, op vochtige ondergrond. Sterk op eenjarige grassen zoals kweekgras, straatgras, raaigrassen en duist. Daarnaast nog enkele breedbladigen zoals, muur, perzikkruid, varkensgras, liggend vetmuur, nachtschade, meldesoorten, ereprijs en netels. Kan indien gewas stilstaat (winter) over gewas worden gespoten.
U46 MCPA 500 7737N (MCPA 500g/l) Brandgevaarlijk!	• Windesoorten: 6 ml/liter • Paardenstaart: 3 ml/liter (om 4 weken) • Jacobskruid: 11 ml/liter • Akkerdistel, weegbree, boterbloem, madeliefje en paardenbloemen: 8 ml/liter	Enkel pleksgewijze toepassing, niet over beplanting toepassen. Bij akkerdistel en paardenbloem in het bloemknopstadium, jacobskruiskruid en madeliefje liefs toedienen in juli/augustus. Bij boterbloem toepassen in mei/ juni of augustus. Niet tussen 1 september en 1 maart.
Focus Plus 10866N (cycloxydim 100 g/l)	• Eenjarige grassen: 1-1,5 liter per ha • Duist/raaigras: 2-3 liter per ha • Kweekgras: 4-6 liter per ha • Hanenpoot: 1-2 liter per ha • Pleksgewijs: 2-12 ml/liter	Tegen éénjarige grassen, inclusief graanopslag als overblijvende gras sen (kweek). Straatgras wordt niet bestreden. Twee tot vijf weken na toepassing is een volledig effect te verwachten. Spuit op een droog gewas en bij droog weer. Binnen één week na de bespuiting geen mechanische bewerkingen uitvoeren. Tegen kweek spuiten zodra dit een lengte van 20 á 25 cm heeft bereikt. Mag niet met handspruitapparatuur worden toegepast! Enkel met bijvoorbeeld een spuitboom op wagentje wat machinaal wordt voortgetrokken!

IN GAZONS, SPORTVELDEN, GOLF EN ZODENTEELT	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
Touchdown Quattro 12552N W2 (glyfosaat 360g/l) Vrij van Tallowamine!	Doodspuiten gazons en sportvelden: 6 liter per ha	Frezen van de grasmat na enkele weken, afhankelijk van het weer.
Fox 480 SC 15193N (Bifenox 480 g/l)	1,5 liter per ha op golfbanen en in de graszodenteelt - Pleksgewijs: 3 ml/liter	Tegen ereprijs, akkerviooltje, paarse dovenetel en hoenderbeet. Toegelaten in graszodenteelt en golfterreinen. Maximaal 1 toepassing per jaar. Niet tussen 1 september en 1 mei.
Dicophar SL 14852N (mecoprop-P 42 g/l, Dicamba 20 g/l, MCPA 70 g/l en 2,4-D 70 g/l) Expiratiedatum 15-8-2027	7,5 liter per ha - Pleksgewijs: 14 ml/liter	Lijkt op AA Mix + MCPP. Sterk op alle onkruiden in grasvegetaties, waaronder varkensgras, muur, melganzevoet, herderstasje, paardenbloem, madelief, weegbree, witte klaver, hoornbloem, duizendblad, boterbloem, brandnetels en klein hoefblad en weegbree. Niet op jonge graszode.
Primus 12175N (florasulam 50g/l)	99 ml per ha - Pleksgewijs: 0,2 ml/ liter	Bestrijdt diverse éénjarige tweezaadlobbige onkruiden, onder andere klaver, kleeftkruid, vogelmuur en echte kamille. Bij percelen die grenzen aan oppervlaktewater op het gehele perceel gebruik maken van DRT75.
Starane TOP 15258N (fluroxypyr-meptyl 333 g/l) Expiratiedatum 15-2-2028	0,6 liter per ha - Pleksgewijs: 1,2 ml/liter	Kort na inzaai mogelijk. Sterk op kleeftkruid, muur, haag- en akkerwinde, grote brandnetel, hennepnetel en veelknopigen zoals perzikkruid, varkensgras en zwaluwtong. Bij veel oud varkensgras kan werking van Primstar tegen varkensgras worden versterkt. De tankmix wordt dan: 1,9 liter Primstar + 0,3-0,4 liter Starane TOP per ha. Niet tussen 1 september en 1 maart.
Tapir 14650N (clopyralid 80 g/l, florasulam 2,5g/l, fluroxypyr-meptyl 144 g/l) Expiratiedatum 01-10-2026	1,5 liter per ha - Pleksgewijs: 3 ml/liter	Tegen paardenbloem, boterbloem, zuring, distels, perzikkruid. Toegelaten in grasvegetaties: gazons, sportvelden graszodenteelt en golfterreinen. Maximaal 1 toepassing per jaar. Niet in grondwaterbeschermingsgebieden. Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen icm kantdop en luchtondersteuning óf lage spuit-boomhoogte (maximaal 30 cm) icm driftarme venturidop en kantdop.
Basagran 6034N (Bentazon 480 g/l)	1,5 – 3,0 liter per ha 3,0 liter per ha tegen knolcyperus (pleksgewijs) - Pleksgewijs: 3-6 ml/liter	Tot eerste maaibeurt maximaal 1,5 liter toepassen, daarna 3,0 liter. Sterk op éénjarige onkruiden zoals: knolcyperus kamille, gele ganzenbloem herderstasje, kleeftkruid, melganzevoet, perzikkruid, vogelmuur. Varkensgras en ereprijssoorten worden niet voldoende bestreden.

SCHIMMELBESTRIJDING	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
Exteris Stressgard 15561N <i>(fluopyram 12,5 g/l + trifloxystrobin 12,5 g/l)</i> Toelating loopt tot 30-06-2027.	10 liter per ha	Preventief in te zetten tegen sneeuwschimmel, rooddraad, dollarspot, anthracnose, bladvlekkenziekte en roest.
Signature Xtra Stressgard 16172N <i>(fosetyl-aluminium 500g/l)</i> Expiratiedatum 31-10-2027	0,5 kg per ha op sportvelden, greens en tees van golfbanen	Ter bestrijding van sneeuwschimmel en bladvlekkenziekte.
Heritage 12553N W2 <i>(azoxystrobin 500g/l)</i> Expiratiedatum 31-05-2028	0,5 kg per ha op sportvelden en golfbanen.	Ter bestrijding van sneeuwschimmel. Bij ongunstige weersomstandigheden binnen 2-4 weken behandeling herhalen. Let op resistentie. Maximaal 2 x per jaar toepassen.
Signum 12630N <i>(pyraclostrobine 6,7% en boscalid 26,7%)</i>	1,5 kg per ha op golfgreens	Tegen dollarspot, fusarium, sneeuwschimmel en anthracnose. Bij ongunstige weersomstandigheden binnen 2-4 weken behandeling herhalen. Let op resistentie. Maximaal 2 x per jaar toepassen. Gebruik 90% drift reducerende doppen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater!
Sirena 15789N <i>(metconazole 60g/l)</i>	1,5 liter per ha op golfgreens	Tegen fusarium, bladvlekkenziekte en kroonroest. Let op resistentie. Maximaal 1 x per jaar toepassen. Gebruik 90% drift reducerende doppen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater!
Doxstar 16886N <i>(Triclopyr-butoxyethyl 209 gr/l Fluroxypyr-meptyl 216 gr/l)</i>	• 1 liter/ha op graszodenteelt! • 1x per teeltcyclus • Ridderzuring, grote brandnetel 200 – 400 liter water/ha • 1 x per teeltcyclus • Ridderzuring, grote brandnetel 200 – 400 liter water/ha	
Frutogard Dollarspot 16148N <i>(kaliumfosfonaten 342 g/l, aminozuren en algenextracten)</i>	3,5 liter per ha	Tegen anthracnose, pythium, fusarium. Maximaal 2 toepassingen met een minimale interval van 7 dagen. Toepassen van maart t/m oktober.

ONGEDIERTEBESTRIJDING	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
Acelepryn 16667N (chlorantraniliprole 210,5 g/l)	0,6 liter per ha Minimaal 600 liter water	Tegen engerlingen en emelten. Selectief middel, tast zenuwreceptoren aan. Profiel nat houden. Toepassen na het uitkomen van de eieren, 1e en 2e larvale stadium. Toepassing 1 x per 12 maanden.
Sumicidin Super 10211N (Esfenvaleraat 25 g/l)	0,3 liter per ha	Tegen larven van de rouwvlieg. Enkel op sportvelden. Maximaal één behandeling per jaar. Sportvelden mogen niet binnen 5 dagen na behandeling worden betreden.
Turex WG 15039N (<i>Bacillus Thuringiensis</i> (Aizawai)25000)	1 kg per ha 0,5-1,0 gram per 1 liter water	Koolwitje, wintervlinder, bastaardsatijnvlinder, eikenprocessierups, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, stippen-, spinselmot en plakker. <i>3 toepassingen per jaar met een minimale interval van 7 dagen tussen toepassing.</i>
XenTari WG 12437N (<i>Bacillus Thuringiensis</i> (Aizawai)15000)	0,1% 1 kg per ha 0,5-1,0 gram per 1 liter water - Bij afmeten: 100 gr = 170 ml	Koolwitje, wintervlinder, bastaardsatijnvlinder, eikenprocessierups, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, stippen-, spinselmot en plakker. <i>8 toepassingen per jaar met een minimale interval van 6 dagen tussen toepassing.</i>
Delfin 10944N (<i>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki</i>)32000)	0,05% 0,5 gram per 1 liter water	Ter bestrijding van rupsen van de bastaardsatijnvlinder, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, spinselmot en plakker. Toepassen zodra vreterij wordt waargenomen.
Gazelle 12809N (acetamiprid 200 g/l)	0,03% 0,25 gram per 1 liter water	Cicaden en bladluizen (boterbloemluis, groene perzikluis, katoenluis, zwarte bonenluis, gewone rozenluis, sjalottenluis, groene kortstaartluis, aardappeltopluis, zwarte kersenluis, groene appeltakluis, groene sparrenluis en vogelkersluis. Niet meer dan 925 liter spuitvloeistof per hectare toepassen. 3-4 keer spuiten vanaf half mei.
NeemAzal-T/S 12455N (azadirachtin 9,85g/l)	0,25% 2,5 ml per 1 liter water	Werkt in op vervelling. Hierdoor worden vooral larvale stadia bestreden. Ter bestrijding van spint, tegen larven van witte vlieg thrips, diverse bladluizen en tegen larven (rupsen) van diverse motten, vlinders en mineervliegen. Het middel is gevaarlijk voor zweefvliegen (<i>Episyrphus balteatus</i>). De behandeling enkele malen (circa 3) herhalen met een interval van een week.
Teppeki 12757N (Flonicamid 50%)	0,14 kg per ha	Tegen bladluizen. Maximaal 3 toepassingen per jaar. Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten. In de volgende gevallen mag je het middel alleen tussen zonsondergang en zonsopkomst toepassen: - Bloeiende gewassen - Niet-bloeiende gewassen die actief worden bezocht door bijen
Scelta 13440N (cyflumetofen 200 g/l)	0,1% 1 ml per 1 liter water	Tegen spint- en roestmijten. Niet vaker dan 4 x per jaar toepassen in blokken van 2 x 2 met een interval van 7 dagen.
Danisaraba 20SC 13439N (cyflumetofen 200 g/l)	0,1% 1 ml per 1 liter water	Tegen spint- en roestmijten. Niet vaker dan 4 x per jaar toepassen in blokken van 2 x 2 met een interval van 7 dagen.

GROENE AANSLAG, MOSSEN EN ALGEN	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
MossKade <i>(diverse gisten en schimmels)</i>	- Levermos: 1:7 - 1:15 - Draadmos: 1:6 - 1:10 - Groene aanslag: 1:4 - 1:10	Tegen levermos, mos en groene aanslag op en tussen straatwerk, houtwerk, betonnen constructies en overige ondergronden. MossKade™ is onschadelijk voor gebruik boven en om vijvers en percelen grenzend aan het oppervlaktewater. MossKade™ is veilig voor mens en dier.
Katoun Gold 15330N <i>(Nonaanzuur)</i>	18 liter per ha	Mossen in openbaar groen en particuliere tuinen en ter bestrijding van mossen op permanent onbeteeld terrein (met de uitzondering van gesloten verharding).