

14 augustus 2020

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Klein fruit (bedekte teelt)	Spintmijt ¹	0.75-1 L/ha	1 L/ha	15 per 12 maanden	15 L/ha per 12 maanden	5
Groenteteelt m.u.v. vruchtgroenten (bedekte teelt)	Witte vlieg ³	0.3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	3 per teeltcyclus	15 L/ha per 12 maanden	5
Sierteeltgewassen (bedekte teelt)	Witte vlieg ³	0.3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	3 per teeltcyclus	15 L/ha per 12 maanden	5
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Spintmijt ¹ , Tomatengalmijt ²	0.15% (150 ml middel in 100 L water)	1.5 L/ha	15 per 12 maanden	22.5 L/ha per 12 maanden	5
	Witte vlieg ³	0.3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	3 per teeltcyclus		
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil	Spintmijt ¹	0.15% (150 ml middel in 100 L water)	1.5 L/ha	15 per 12 maanden	22,5 L/ha per 12 maanden	5

Toepassings gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
(bedekte teelt)	Witte vlieg ³	0.3% (300 ml middel in 100 liter water) ³	3 L/ha	3 per teeltcyclus		
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met niet-eetbare schil (bedekte teelt)	Spintmijt ¹	0.15% (150 ml middel in 100 L water)	1.5 L/ha	15 per 12 maanden	22,5 L/ha per 12 maanden	5
	Witte vlieg ³	0.3% (300 ml middel in 100 liter water)	3 L/ha	3 per teeltcyclus		

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Spintmijt¹ (*Tetranychus urticae*)

Tomatengalmijt² (*Aculops lycopersici*)

Wittevlieg³ Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*) en tabakswittevlieg (*Bemisia tabaci*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Let op: de verpakking naspoelen bij het vullen van de tank wegens beperkte uitschenkbaarheid van het middel.

In de bedekte teelt van kleinfruit en de bedekte teelt van vruchtgroenten het middel toepassen in 600-1000L water/ha.

In de bedekte groenteteelt m.u.v. vruchtgroenten het middel toepassen in 200-1000 L water/ha.

In de bedekte sierteelt het middel toepassen in 500 tot 1000L water/ha.

Bevat *Beauveria bassiana* strain ATCC 74040. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Het is niet uitgesloten dat er na toepassing van het middel bij hoge luchtvochtigheid nuttige insecten geïnfecteerd worden met *Beauveria bassiana*. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.